

Amit a Humán Papilloma Vírusok (HPV) okozta nemi szervi szemölcsökről tudni kellene.

A humán papilloma vírus (HPV) okozta fertőzés az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint, a leggyakoribb vírusos eredetű, elsődlegesen nemi érintkezéssel közvetített betegség.

Napjainkig a HPV több, mint 100 típusát különítették el, amelyek egy jelentős része a nemi szervek nyálkahártyáját és a nemi szervi-végbél nyílás körüli bőrt betegítik meg.

A HPV típusokat daganatkeltő képességük alapján alacsony és magas rizikó csoportba szokás osztani.

Az igen gyakori nemi szervi szemölcsöket (condyloma acuminatum) elsősorban az ún. alacsony rizikójú HPV-k idézik elő (leggyakrabban HPV 6 és 11). Ezek tulajdonképpen jóindulatú növedékek, amelyek lappangási ideje általában hosszú, akár több hónap vagy év is lehet. A fertőzés általában több gócu, klinikai megjelenése függ a lokalizációtól. Másképpen néznek ki az elszarusodó hám területén kialakuló szemölcsök, mint a nyálkahártyán növekvők. Szubjektív panaszt nem okoznak, azonban kezelés nélkül extrém nagyságot is elérhetnek. Igen fontos, hogy a tünetmentes, de fertőzött betegek a vírusok átadásában igen nagy szerepet játszhatnak. További problémát jelenthet, hogy a betegek egyidejűleg az ún. magas onkogén potenciállal rendelkező HPV vírusokkal is fertőződhetnek.

Napjainkban jogos igényként fogalmazódik meg a szexuálisan aktív lakosságban számos kérdés, amely a HPV fertőzéssel, megelőzéssel, vírusos szemölcsök kezelési lehetőségeivel és a Magyarországon is elérhető HPV vakcinációval kapcsolatos.

Nemgyógyász szakorvosaink készséggel állnak rendelkezésre, amennyiben tanácsadást, felvilágosítást szeretne, vagy HPV szűrővizsgálat elvégzését kéri.

A HPV vakcina javallat szerinti beadását is készséggel elvégzik.

Dr. Várkonyi Viktória
bőr- és nemigyógyász szakorvos, kozmetológus

Virányos Klinika
www.viranyosklinika.hu