

Komplex emlővizsgálatok a Virányos Klinikán

A női mell betegségei igen gyakoriak – fájdalmas vagy fájdalomtalan csomók, gyulladások, ciszták, ütések utáni bevérzésekkel kapcsolatos panaszok miatt számos nő keresi fel orvosát. Természetesen a panaszmentes hölgyek szűrő jellegű vizsgálatai is igen fontosak épp azért, mert az időben, korán felfedezett eltéréseket (ha szükséges) időben meg is lehet gyógyítani. A különféle szépészeti beavatkozások előtt pedig a rendes kivizsgálás része az emlő részletes vizsgálata.

Az emlővizsgálatok

Fizikális vizsgálat

Valamennyi diagnosztikai vizsgálat áttapintással kezdődik, ilyenkor keressük azokat a strukturális eltéréseket, amelyek felkelthetik a gyanút, és szükségessé teszi, hogy bizonyos területekre fokozott figyelmet fordítsunk.

Ultrahang vizsgálat

A fiatalok számára épp a fiatal, mirigyállományban gazdag emlők vizsgálatára az **ultrahang** a választandó módszer. Nagy felbontású vizsgálófejjel vizsgálva megtalálhatók a különféle ciszták, jóindulatú és rosszindulatú daganatok, gyulladások vagy tályogok, akár már a 1,5-2 mm-es eltérések is.

A mellnagyobbító műtétek előtti kivizsgálás során pedig a plasztikai sebész képet kap arról, hogy mire számíton a műtét során, a műtétek után pedig a rendszeres utánkövetés, a 3., majd 12. havi kontroll, valamint az ezt követő éves kontrollvizsgálatok szolgálják pácienseink egészségét.

Mammográfia

40 éves kor fölött az ultrahangon kívül a **mammográfia** is a diagnosztikai eszköztárunk része. A hagyományos röntgenfelvételektől eltérő fizikai paraméterekkel és fotótechnikával készül az emlő röntgenfelvétele, a mammográfia. Emiatt alkalmas arra, hogy a lágyrészek finom szerkezeti eltéréseit kimutassa.

A mammográfia során nagy felbontású röntgenfelvételek készülnek a női mellről, ilyenkor meg lehet találni a különféle eredetű apró, akár tühegynyi meszesedéseket is, melyek hátterében sajnos számos esetben mellrák áll.

A statisztika szerint a magyar nők legalább 20 %-át érinti a mellrák, ami időben felfedezve 80 % fölötti arányban teljesen meggyógyítható. Kiegészítésként mindig elvégezzük az ultrahangvizsgálatot is, ennek oka a két eljárás fizikai alapjai közti különbség, ennek folyományaként pedig az, hogy más-más jellegű eltéréseket lehet megtalálni.

Mind az ultrahangos áttekintést (40-45 éves kor alatt), mind a mammográfiát (40-45 éves kor fölött) ajánljuk panaszmentes pácienseinknek is, ugyanis minél korábban találunk meg egy betegséget, annál biztosabb a gyógyulás.

Dr. Turóczy Gergely
radiológus szakorvos

Virányos Klinika
www.viranyosklinika.hu

